

Intervento in risposta a un'overdose di oppioidi

Segui questi passaggi per somministrare un'iniezione di naloxone Prenoxad

1

SICUREZZA


Controlla che la persona e l'area non pongano alcun pericolo.



2

OVERDOSE DA OPIOIDI? INDIVIDUA I SINTOMI

- La persona non risponde
- La persona ha le pupille a spillo
- Non respira normalmente: respirazione lenta e superficiale o russamento
- La persona ha la pelle pallida o fredda e le labbra e i polpastrelli blu o grigi



3

CHIAMA IL TRIPLO ZERO (000)


Penso sia un'overdose



4

SDRAIA LA PERSONA SU UN FIANCO


Metti la persona nella posizione laterale di sicurezza.



continua alla pagina successiva

5

AVVITA L'AGO SULLA SIRINGA PRERIEMPITA DI PRENOXAD



6

POSIZIONA L'AGO


Inserisci l'ago nella parte esterna della coscia o nella parte superiore del braccio.



7

SOMMINISTRA UNA DOSE DI NALOXONE


Inietta 0,4 ml fino ad arrivare alla prima linea nera sulla siringa (la siringa di Prenoxad contiene 5 dosi).



8

LA PERSONA RESPIRA?

In caso contrario, utilizza la *respirazione artificiale*, se sei in grado di praticarla: metti la persona in posizione supina ed effettua due insufflazioni.



9

POSIZIONE DI SICUREZZA

Metti la persona nella posizione laterale di sicurezza.


Resta con la persona fino all'arrivo dell'ambulanza.



10

RIPETI LA DOSE SE NECESSARIO

Se la persona continua a non rispondere inietta un'altra dose da 0,4 ml (fino alla linea nera successiva) ogni 2 o 3 minuti fino al risveglio della persona o fino all'arrivo dell'ambulanza.



Utilizza il naloxone per invertire gli effetti di un'overdose da oppioidi (ad esempio eroina, morfina, metadone, ossicodone, oppiacei da prescrizione, fentanile). Ci vogliono tra i 2 e i 5 minuti prima che faccia effetto e questo durerà circa 30-90 minuti.

Per ricevere questo documento in un altro formato, invia un'e-mail all'indirizzo <aod.enquiries@health.vic.gov.au >.

Riprodotta su autorizzazione, NSW Health © 2023.

Autorizzato e pubblicato dal Governo del Victoria, 1 Treasury Place, Melbourne. © Stato del Victoria, Australia, Ministero della Salute, ISBN 978-1-76131-460-5 (pdf/online/MS word).

Disponibile sul [sito del Ministero](https://www.health.vic.gov.au/aod-treatment-services/victorias-take-home-naloxone-program) <https://www.health.vic.gov.au/aod-treatment-services/victorias-take-home-naloxone-program>. Novembre 2023. (2303380).