

## Hemofilična influenza tipa B (Hib) i hepatitis B

*Bosnian*

### Informacije o imunizaciji

#### Hepatitis B

Ovaj virus djeluje na jetru i može izazvati groznicu, mučninu, zamor, proljev, tamnu mokraću i žutu kožu..

Sva djeca pod rizikom od hepatitisa B trebala bi biti zaštićena protiv ove bolesti. Imunizacija protiv hepatitisa B se trenutno preporučuje ako je majka djeteta nosilac hepatitisa B i djeci koja dolaze iz sredina gdje postoji visoka rasprostranjenost infekcije od hepatitisa B. Provjerite sa Vašim doktorom ili na klinici za imunizaciju ako mislite da Vašem djetetu treba ova vakcina.

Većina male djece i oko pet procenata odraslih, koji uhvate virus, postaju “nosioci” infekcije hepatitisa B i mogu ga prenositi na druge. Ovi nosioci su takođe pod rizikom da, kasnije u životu, dobiju bolesti jetre i rak.

Hepatitis B virus se obično prenosi kroz krv inficirane osobe, seksualnim odnosom ili sa majke na dijete prilikom rođenja.

U starijem dobu, virus se može prenijeti putem aktivnosti kao što su sex bez zaštite, drogiranje injekcijama, tetoviranje ili body piercing (probijanje ušiju i drugih dijelova tijela), koristeći pribor koji nije sterilizovan, te kontakt spotovima.

#### Hemofilična influenza tipa B (Hib)

Hib je, prije nego što se počela koristiti Hib vakcina, bio najčešći uzrok životno opasnim infekcijama kod djece mlađe od pet godina. Uprkos imenu, nema nikakve veze sa influencom.

Hib može izazvati:

- infekcije moždane opne

- oticanje grla, što može blokirati disanje
- upalu pluća
- infekciju zglobova
- infekciju potkožnog tkiva, naročito na licu

Ovi poremećaji se brzo razvijaju i, ako se ne liječe, mogu ubrzano dovesti do smrti.

#### Hepatitis B i Hib imunizacija

Trenutno su na snazi dva plana imunizacije.

Sva djeca rođena prije 1. maja 2000 komletirati će imunizaciju po starom planu. Kura vakcinacije protiv hepatitisa B uključuje inicijalnu dozu, drugu dozu, koja se daje četiri sedmice poslije i treću, koja se daje šest mjeseci poslije inicijalne doze.

Nekoliko doza Hib vakcine potrebno je djeci rođenoj prije 1. maja 2000, da biste zaštitili Vaše dijete protiv Hib-a. Djeca do pet godina starosti koja nisu imunizirana kao bebe, trebaju primiti Hib vakcinu. Hib je rijetko problem kod djece starije od pet godina.

PedvaxHib vakcina se koristi u Australiji. Ona sadrži malu količinu od jednog dijela Hib bakterije spojene sa proteinom koji stimulise imunu reakciju. Vakcina takođe sadrži malu količinu aluminijske soli.

Djeca rođena 1. maja 2000 ili poslije, imaju novi plan imunizacije. Ona će primiti hepatitis B vakcinu kratko nakon rođenja, dok su još u bolnici. Naknadne doze kure vakcine protiv hepatitisa B, primaju se sa napunjenih 2, 4 i 12 mjeseci života, kao kombinovana vakcina Hib(Hemofilična influenza tipa B)/hepatitis B (COMVAX). Kombinovana vakcina sadrži komponentu vakcine PedvaxHIB.

## ***Moguće nuspojave hemofilična influenza tipa B/hepatitis B vaccine***

Većina nuspojava su minorne i brzo nestaju. Slijedeće reakcije nisu česte i ako se pojave, onda je to brzo nakon imunizacije:

- blaga groznica
- bol, crvenilo i oticanje mjesta uboda
- mučnina
- osjećaj slabosti
- bol u zglobovima

Ako se ove nuspojave dogode, one se mogu ublažiti:

- dajte djetetu da pije dosta tečnosti
- ne oblačiti previše odjeće
- staviti hladnu, mokru krpu na bolno mjesto uboda
- dajte djetetu paracetamol da se smanji nelagoda (daje se doza, preporučena za godine Vašeg djeteta)

Ukoliko su reakcije teže i trajnije, ili ako ste zabrinuti za dijete, kontaktirajte Vašeg doktora ili bolnicu.

## **Provjera prije imunizacije**

Prije imunizacije obavijestite doktora ili sestru o Vama i Vašem djetetu:

- ako ste slabi na dan imunizacije
- ako ste imali jaku reakciju na bilo koju vakcinu

Mi sa zahvalnošću cijenimo doprinos Odjela za zdravlje i brigu o starijima za ove informacije.