

轮状病毒

免疫接种信息

轮状病毒

轮状病毒会造成一种严重的肠胃炎感染。有些人不显示任何症状，但幼儿很可能出现各种严重症状，从轻度腹泻到可能致命、需要住院治疗的脱水腹泻。

2007 年开始了一项全国轮状病毒疫苗接种计划，据估计，住院病例每年减少了 7000 多起。入院治疗的患者感染严重程度通常也有所降低。

你可以通过免疫接种降低孩子受轮状病毒感染的风险。所有儿童都应该接种疫苗。不接受免疫接种的儿童如果食物、水或手被受感染者的粪便污染，就会染上轮状病毒。

疫苗极少有严重副作用或过敏反应。如果你对于孩子对任何疫苗的反应感到担心，请立即求医。

针对轮状病毒的免疫接种

全国免疫接种计划（National Immunisation Program Schedule）提供免费的轮状病毒疫苗接种保护。在维多利亚州，婴儿的轮状病毒免疫接种是免费的，在婴儿两个月和四个月时分两剂口服。第一剂必须不迟于婴儿 14 周零六天时接种，第二剂必须不迟于 24 周零六天时接种。

该疫苗不提供针对其它类型腹泻的保护，但能降低轮状病毒造成的致命腹泻的风险。

免疫接种前的检查清单

如果你的孩子有以下情况，请在接种疫苗之前告诉医生或护士：

- 已经超过任何一剂疫苗的建议接种年龄范围
- 身体不适（体温超过 38.5°C）
- 曾对任何疫苗有严重反应
- 曾对任何东西严重过敏
- 曾出现肠套叠，或有可能导致肠套叠的先天性异常
- 正在服用类固醇药物
- 曾接受过输血或血液产品
- 由于免疫系统缺损、异常血液疾病或失调、HIV 或特定药物而免疫力较低
- 你家中有人免疫力较低。

轮状病毒疫苗的副作用

尽管所有药物都会有意外副作用，但轮状病毒疫苗有效而且安全。

副作用可能包括：

- 接种疫苗之后，一些婴儿的粪便中会含有轮状病毒——建议一定要在患尿布以后彻底洗手，免疫力较低的人在这段时间内应避免接触脏尿布。

免疫接种的罕见副作用

任何疫苗都有非常小的严重过敏反应风险。所以，建议你在免疫接种之后在诊所待至少 15 分钟，以防需要进一步治疗。

在极少的情况下，婴儿接种第一剂或第二剂轮状病毒疫苗后三个星期内会出现肠套叠（肠的一部分像伸缩望远镜一样滑入紧邻的另一部分，造成肠堵塞）。婴儿可能出现肠套叠的迹象包括：

- 突然大哭
- 脸色苍白
- 两腿缩向胃部。

澳大利亚和海外最近的研究显示，婴儿接种第一剂和第二剂轮状病毒疫苗后的头三个星期内，出现肠套叠的风险略微上升。该风险比例约为每 10 万名接种疫苗的婴儿中多六例肠套叠，或澳大利亚一年多 14 名婴儿出现肠套叠。

从哪里获得帮助

- 你的医生
- 当地政府免疫接种服务
- Better Health Channel <https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/rotavirus-immunisation>

如需本出版物的无障碍格式版本，请致电 1300 882 008（如果需要，可使用 National Relay Service, 13 36 77），或发电子邮件至 immunisation@dhhs.vic.gov.au。

由维多利亚州政府（1 Treasury Place, Melbourne）授权并出版。

© 维多利亚州卫生和民事服务部，2017 年 6 月。