

Rotavirüs

Aşı bilgileri

Rotavirüs

Rotavirüs bulaşıcı ciddi mide yangısına neden olur. Kimi kişilerde belirtiler görünmez ama çok küçük çocukların hafif ishalden hastaneye kaldırılmayı gerektiren ve ölüme yol açabilen yaşamı tehdit edici su çeker ishale kadar ciddi belirtiler geliştirme olasılığı vardır.

Ulusal bir rotavirüs aşı programı 2007'de başlamıştır ve hastaneye kaldırmaların her yıl 7.000'den fazla bir şekilde azaldığı tahmin edilmektedir. Hastaneye gidenleri genellikle daha önemsiz şekilde etkilenmiş olanlardır.

Bebeğiniz için rotavirüs enfeksiyon riskini aşı ile azaltabilirsiniz. Tüm çocuklar bu aşığı olmalıdır. Aşı olmazsa, yiyecekleri, suları veya elleri, hastalığın bulaştığı bir kişinin dışkısı (kakası) ile kirlenirse, rotavirüse yakalanabilirler.

Bu aşının ciddi yan etkileri veya ona gösterilen alerjik tepkiler seyrekdir. Çocuğunuzun herhangi bir aşığı tepki göstermesinden endişeleniyorsanız, hemen doktorunuzu görün.

Rotavirüse karşı aşı

Rotavirüse karşı koruma, Ulusal Aşı Programı Planı çerçevesinde ücretsizdir. Victoria'da bebekler için rotavirüs aşısı ücretsizdir ve iki ve dört aylıkken iki doz olarak ağızdan verilir. Birinci doz, bebekler 14 hafta altı günlük ve ikinci doz 24 hafta altı günlük olmadan verilmelidir.

Aşı, diğer ishal türlerine karşı koruma sağlamaz ama rotavirüsün neden olduğu yaşamı tehdit edici ishal eiskini azaltır.

Aşı öncesi kontrol listesi

Aşı olmadan önce bebeğiniz şu koşullara sahipse, doktorunuza veya hemşirenize söyleyin:

- dozları için tavsiye edilen yaş aralıklarından büyükse
- iyi değilse (ateşleri 38.5 derecenin üstündeyse)
- herhangi bir aşığı karşı ciddi reaksiyon göstermişse
- herhangi bir şeye karşı ciddi alerji göstermişse
- intususepsiyon geçirmişse veya intususepsiyona yol açan doğuştan anormalliği varsa
- steroid ilaç alıyorsa
- kan nakli veya kan ürünleri almışsa
- bağışıklık sistemi bozukluğu, anormal kan koşulları veya bozuklukları, kanser, HIV veya belirli ilaçlar nedeniyle bağışıklığı azalmışsa
- evinizdeki bir kişi düşük bağışıklığa sahipse.

Rotavirüs aşısının yan etkileri

Rotavirüse karşı aşı etkili ve güvenlidir, ancak tüm ilaçların istenmeyen yan etkileri olabilir.

Yan etkiler şunları içerebilir:

- kimi bebeklerin kakaları aşından sonra rotavirüs içerebilir – bez değiştirdikten sonra ellerin iyice yıkanması tavsiye edilir ve düşük bağışıklığa sahip kişiler bu zaman içinde kirli bezlerden kaçınmalıdır.

Aşının ender yan etkileri

Herhangi bir aşıya karşı çok küçük de olsa alerjik reaksiyon riski (aşırı duyarlılık) vardır. Bu nedenle, daha başka bir tedavinin gerekmesi olasılığına karşı, aşından sonra en az 15 dakika kadar klinik veya muayenehanede kalmanız tavsiye edilir.

İntususepsiyon (bağırsağın bir kısmının, bir teleskopun parçaları gibi, bir sonraki bağırsak parçasına kaymasının neden olacağı tıkanma) bebeklerde (ender durumlarda), birinci veya ikinci doz rotavirüs aşısını olduktan sonra meydana gelebilir. Bir bebekte intususepsiyon olabileceğinin belirtileri şunlardır:

- ağlama krizleri
- solgunlaşmak
- bacakları mideye doğru çekmek.

Avustralya'da ve yurt dışında son zamanlarda yapılan incelemeler, birinci ve ikinci doz rotavirüs aşısı olduktan sonraki ilk üç hafta içinde bebeklerde intususepsiyon riskinin az miktarda arttığını belirtmektedir. Bu risk, aşı olan her 100,000 bebeğin fazladan yaklaşık altısında görülür veya Avustralya'da yılda 14 ek bebeğin intususepsiyon aldığı görülür.

Nereden yardım alınabilir

- Doktorunuz
- Belediye aşı servisiniz
- Daha İyi Sağlık Kanalı <https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/rotavirus-immunisation>

Bu yayını erişilebilir bir formatta almak için 1300 882 008'i arayın, gerekirse Ulusal İletişim Servisi'ni 13 36 77'den arayın, veya immunisation@dhhs.vic.gov.au adresine elektronik posta yollayın.

Victoria Hükümeti, 1 Treasury Place, Melbourne, tarafından yetkilendirilmiş ve yayınlanmıştır.

© Victoria Eyaleti, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı Haziran 2017.