

輪狀病毒

Rotavirus

疫苗接種信息

Traditional Chinese

輪狀病毒

輪狀病毒 (Rotavirus, 簡稱 RV) 是導致嚴重感染性腸胃炎的起因。有些人沒有症狀，但年幼孩童則有較大機會發生嚴重症狀：從輕度腹瀉到危及生命，需要住院治療並導致死亡的脫水性腹瀉。

2007 年開始實施全國輪狀病毒疫苗接種計劃以來，估計入院的人數每年已減少 7,000 多人。那些到醫院的病人症狀通常較輕微。

為您的嬰兒接種疫苗可以降低輪狀病毒感染的風險。所有兒童都應該接種疫苗。如沒有接種疫苗，他們的食物、水或手可能會沾染到感染病患的糞便 (poo) 而受輪狀病毒的感染。

接種疫苗很少出現嚴重副作用或過敏反應。如您擔心孩子接種疫苗會出現反應，請立即見你的醫生。

輪狀病毒防疫注射

全國疫苗接種計劃 (National Immunisation Program Schedule) 免費提供輪狀病毒防疫注射。在維多利亞州，嬰兒接受輪狀病毒疫苗接種是免費的，疫苗有兩劑：分別在嬰兒 2 個月和 4 個月時口服。嬰兒必須在 14 週和 6 天之前口服第一劑，第二劑則必須在 24 週和 6 天之前口服。

疫苗不能預防其他類型的腹瀉，但可以降低輪狀病毒引致危及生命的腹瀉的風險。

疫苗接種前核對表

服用疫苗前如果嬰兒有下列情況請告訴醫生或護士：

- 嬰兒年齡已經超過建議的兩劑疫苗服用年齡
- 身體不適 (體溫超過 38.5°C)
- 曾對任何疫苗有嚴重反應
- 曾對任何東西有嚴重過敏
- 曾有腸套疊或可能導致腸套疊的先天性異常
- 正在服用類固醇藥物
- 接受了輸血或其他血液製品
- 因免疫系統缺乏、異常血液狀況或失調、癌症、艾滋病毒 (HIV) 或某些藥物引起的免疫力降低
- 家庭中是否有人免疫力降低

輪狀病毒疫苗的副作用

輪狀病毒疫苗有效而安全，不過所有藥物都會有不良副作用。

副作用可能包括：

- 接種疫苗後有些嬰兒的糞便可能帶有輪狀病毒，建議您在換尿布後務必徹底洗手，免疫力較低人士在此期間應避免碰觸髒尿布。

疫苗接種的罕見副作用

任何疫苗都有極微小的嚴重過敏反應 (anaphylaxis) 風險，因此奉勸應在疫苗接種之後留在診所或醫療中心至少 15 分鐘，以防需要進一步的治療。

腸套疊：嬰兒服用第一或第二劑輪狀病毒疫苗後三週可能會發生腸套疊（一段腸道如同伸縮望遠鏡一般滑入下一段腸道造成的阻塞）。嬰兒發生腸套疊的跡象包括：

- 一陣一陣的哭泣
- 面色蒼白
- 把雙腿拉到腹部

最近澳洲和海外的研究顯示，嬰兒在服用第一劑和第二劑輪狀病毒疫苗後的頭三週發生腸套疊風險的趨勢略微上升。在澳洲的風險率為每 10 萬個接種疫苗的嬰兒中發生腸套疊病例的嬰兒大約增加六個，也就是每年增加 14 病例。

哪裡求助

- 您的醫生
- 您當地政府的疫苗接種服務處
- 瀏覽「健康頻道」網站：Better Health Channel
<https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/rotavirus-immunisation>

若需本刊物的無障礙格式版請致電 1300 882 008，若有需要，請使用全國轉接服務 (National Relay Service) 13 36 77，或電郵 immunisation@dhhs.vic.gov.au

維州政府授權出版，地址：1 Treasury Place, Melbourne

©版權所有，維州政府衛生與公眾服務部，2017 年 6 月