

රෝටොවයිරස් (Rotavirus)

ප්‍රතිඵ්‍යක්තිකරණ තොරතුරු

රෝටොවයිරස්

රෝටොවයිරස් මගින් ගෙක්පූජනවරුවින් ආකාරයේ දුරුණු බොටන රෝගක් ඇති කෙරට. සමඟ අය මේ සම්බන්ධ රෝග ලක්ෂණ තොපොන් අතර, බාල ලුමුන් විසින් ගාලානා පාවනය සිට රෝගුගෙන කිරීම අවශ්‍ය මිරුභාය නැඩි පිටිත තරජන ඇති කරන විරුදුකය වන පාවනය දුක්වා දුරුණු රෝග ලක්ෂණ පෙන්වීමට බොගුන් ඉඩිකි ඇත.

2007 දී පාඨික රෝටොවයිරස් එන්නත වැඩසටහනක් ආරම්භ කළ අතර එම මගින් ව්‍යාපෘති රෝගුගෙන කරන ප්‍රමානය 7,000 කට වැඩි සංඛ්‍යාවකින් අඩුවේ ඇති බව ගෙනු බලා ඇත. රෝගු වෙත යන අය මුදල අඩුවායෙන් රෝගය හේතුවෙන් බලපෑමට තෙවැටු ඇයවේ.

ප්‍රතිඵ්‍යක්තිකරණය ලබාදීම මගින් බොගු හට රෝටොවයිරස් මගින් ඇතිවන අවදානම අඩුකර ගත හැකිය. සියලුම දුරුවන් විසින් මෙම එන්නත බොගු දුනුය. ඔවුන් හට ප්‍රතිඵ්‍යක්තිකරණය ලබා තොකුනුගෙන්, ඔවුන්ගේ ආභාර, ජලය, ශේ අත් ආකාශන්‍යවුනු අයෙකුගේ අසුව් සමඟ සම්බන්ධවාගෙන් ඔවුනට රෝටොවයිරස් වැඩුදිය ඇයිය.

එන්නත මගින් දුරුණු අතුරු ආභාර ශේ දුරුණු අකාත්මිකතාවයෙන් ඇතිවේම විරුදුය. ඔබගේ දුරුවා විසින් බිජිම එන්නතකට දුරුවාගේ ප්‍රතිච්චා සම්බන්ධයෙන් සහන්ත්‍රාලේ ඇතිනම්, වහාම ඔබගේ වෙළඳුවරය තුළවනු.

රෝටොවයිරසයට එරෙහි ප්‍රතිඵ්‍යක්තිකරණය

ජාතික ප්‍රතිඵ්‍යක්තිකරණ වැඩසටහන යෙතෙහි නොමිලේ ආර්සාව ලබාදේ. විකෘතිය ප්‍රාත්තය බිලුදුන් හට රෝටොවයිරසයට එරෙහි ප්‍රතිඵ්‍යක්තිකරණ තොමිලේ ලබාදේ. මෙය වයස මාය උදාන්ත්‍යා සහ හතුරුදී මාත්‍රා දෙශක වශයෙන් කටින ලබාදේ. පළමු මාත්‍රාව බිලුදු සහ 14ක් දින ගෙකින්ද, දෙවන මාත්‍රාව බිලුදුට සහ 24 ක් දින ගෙකින්ද ලබාදිය යුතුය.

මෙම එන්නත මගින් යෙන්න ආකාරයේ පාවනයට ආර්සාව ලබා තොකුනුන්ද, රෝටොවයිරස් මගින් පිටිතයට තරජන ඇති කරන පාවනයට ඇති අවදානම අඩු කරනු ඇත.

ප්‍රතිඵ්‍යක්තිකරණයට පෙර අවශ්‍ය සොඳුක් ලැයිස්තුව

එන්නත බොගුනීමට පෙර ඔබගේ බිලුදු සම්බන්ධයෙන් පහත එද අදාළ නම් ඔබගේ වෙළඳුවරය වෙත දැනුම් දෙන්න:

- මාත්‍රාවලුන් එකකට ශේ තිරුණු කළ වයසට වැඩිනම්
- අස්ථිපෙනම් (ලේඛනවය 38.5°C ව්‍යා වැඩිනම්)
- බිජිම් එන්නතකට දුරුණු ප්‍රතිච්චා ඇතිකර තිබුණෝ නම්
- බිජිම් උදාන්ත්‍යා දෙශක දුරුණු අකාත්මිකතාවයක් ඇතිනම්
- අන්තරස්ථාපනය (intussusception) තුළුදෙන අන්තරස්ථාපනය ශේ උපතින ඇතිවූ අකාමානනතාවයක් ඇතිනම්
- ස්වරෝයිඩ් සහිත බොගු ගන්නේ නම්
- රැකිර පාරවියලනයක ශේ රැකිර සහිත දෙශක තිරුරට ලබා දුනී නම්
- ප්‍රතිඵ්‍යක් තුම දානතාවය, රැකිරයේ අකාමානන තත්ත්වයක, පිළිකා, එම්.අං.වී. ශේ සමඟ බොගු හේතුවෙන් ප්‍රතිඵ්‍යක්තිය හින්වී ඇතිනම්
- ඔබගේ තිව්‍යක හිකිවෙකුගේ ප්‍රතිඵ්‍යක්තිය හින්වී ඇතිනම්.

රෝටොවයිරස් අතුරු ආභාර

සියලුම බොගුනීම අන්වය අතුරු ආභාර තිබුණුද, රෝටොවයිරසයට එරෙහි එන්නත එලුදායි සහ ආර්සාකාරීවේ.

අතුරු ආබාධ අතර පහතරදී ඇත්:

- එත්නතට පසුව බිමුදුන්ගේ අසුව්වල රෝටලයිරයක විධිය හැකිය. නැඳී මාරුකළ පසු අත තොදීත් කොදා ගැනීම සැම්විටම හිරඳු කෙරේ. තවද අඩු ප්‍රතිශක්තිකරණය ඇති අය මෙම කාලයේදී කිලෝමූලි තැනි ගැවිතයෙන වැළඳිය යුතුය.

ප්‍රතිශක්තිකරණයෙන් ඇතිවන විරුල අතුරු ආබාධ

මිනෑම එත්නතක මිනි දුරයුම් අකාතමික ප්‍රතිශක්තික (අන්තිලයකික) ඇතිවේම් ඉතා අඩු අවදානමක ඇත. මේ තේතුව නිසා වැසිදුර ප්‍රතිකාර අවශ්‍යවතාත ප්‍රතිශක්තිකරණය බොදුමෙන් පසු අවම වශයෙන් මිනිතතු 15ක වන සායනය හේ ගෙවදු ගෙන්නාගාරයේ රුදී සිටින මෙය ඔබට අවවාද කෙරේ.

රෝටලයිරය එත්නතේ පළමුවන හේ දෙවන මාත්‍රාව බොදුමෙන් සහ තුනකට පසුව බිමුදුන් තව අත්තරස්ථාපනය (වෛම්කාජ්‍ය කිහිපය මෙන් ප්‍රකාශ ඇති ප්‍රකාශක අත්තරස්ථාපනය ඇත) සිදුවිය හැකිය (ඉතා විරුල අවස්ථාවල). බිමුදු තව අත්තරස්ථාපනය ඇති බවට ඇති රෝග මෙහෙයු අතර පහතරදී හැකිය හැකිය:

- ඩිජිතල වාරයකදී හැකිය
- සුදුමැල පෙනුම
- දෙරා උදුරය දෙකට ඉස්සීම

මෙහෙතුන් සිස්ට්‍රූලයෙනු සහ විදේශ අධ්‍යාපනය මිනි ගෝපන වන්නේ පළමුවන සහ දෙවන රෝටලයිරය මාත්‍රාව ගත දිනට පසු සහ තුනකින් බිමුදුන් අතර අත්තරස්ථාපනය ඇතිවේම් වැඩි අවදානමක ඇති බවයි. එත්නත කළ බිමුදුන් 100,000 කින් අමතර 4 දෙනෙකුට අත්තරස්ථාපනය ඇතිවේම් අවදානමක ඇති. නගරගාර සිස්ට්‍රූලයාවේදී වකරකට එත්නත කරන දුරටත්ගෙන් අමතර බිමුදුන් 14 දෙනෙකුට අත්තරස්ථාපනය ඇතිවේ.

ලපකාර ලබා ගත ගැකි ස්ථාන

- ඔබගේ ගෙවදුවරකා
- ඔබගේ පළාත්තාන අයන ප්‍රතිශක්තිකරණ ගෝපන
- බෙටර ගෙල්ර වෙනල (Better Health Channel) <https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/rotavirus-immunisation>

මෙම ප්‍රකාශනය කියවිය හැකි ආකාරයට ලබා ගැනීම සඳහා, අවශ්‍යනම් ජාතික රේලේ ශේවාව (National Relay Service) වන 13 36 77 උපයේගේ කරගෙන දුරකථන අංක 1300 882 008 අමතන්න, නැතිනම් immunisation@dhhs.vic.gov.au වෙත රෝමිල් පත්‍රිකාවක් යටත්න.

බලය බොදු ප්‍රකාශයට පත්කරල හි 1 Treasury Place, Melbourne විස්ටෝරියෙනු රුප මිනි.

© විස්ටෝරියෙනු රුප, සෞඛ්‍ය සහ මාත්‍රාව ගෝවා දෙපාර්තමේන්තුව දුති 17.