

فيروس الروتا

معلومات التطعيم

فيروس الروتا

يسبب فيروس الروتا شكل معدي خطير من أشكال التهاب المعدة والأمعاء. لا تظهر أي أعراض عند بعض الناس، ولكن الأطفال الصغار جداً هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض خطيرة تتراوح بين الإسهال الخفيف إلى الإسهال الذي يؤدي إلى الجفاف المهدد للحياة الذي يتطلب دخول المستشفى ويمكن أن يؤدي إلى الموت.

وقد بدأ في عام 2007 برنامج وطني للتطعيم ضد فيروس الروتا، ويقدر إنخفاض عدد حالات دخول المستشفيات بأكثر من 7000 حالة في كل عام. وعادة ما يكون أولئك الذين يدخلون المستشفى أقل تأثراً.

يمكنكم تقليل خطر إصابة طفلكم بفيروس الروتا بالتطعيم. وينبغي أن يتلقى جميع الأطفال اللقاح. إذا لم يتم تطعيمهم، يمكنهم الإصابة بفيروس الروتا إذا كان طعامهم أو مائهم أو أيديهم ملوثة ببراز شخص مصاب.

الأثار الجانبية الخطيرة أو الحساسية للقاح هي نادرة. إذا كنتم قلقين بشأن رد فعل طفلكم لأي لقاح، راجوا الطبيب فوراً.

التطعيم ضد فيروس الروتا

تتوفر الحماية ضد فيروس الروتا مجاناً في إطار جدول البرنامج الوطني للتطعيم. في فيكتوريا، التطعيم ضد فيروس الروتا هو مجاناً للأطفال الرضع، ويتم إعطاه عن طريق الفم على جرعتين في الشهر الثاني والرابع من العمر. يجب إعطاء الجرعة الأولى في الوقت الذي يبلغ فيه الأطفال 14 أسبوعاً وستة أيام من العمر ويجب إعطاء الجرعة الثانية قبل 24 أسبوعاً وستة أيام من العمر.

لا يحمي اللقاح من أنواع أخرى من الإسهال، ولكنه يقلل من خطر الإسهال المهدد للحياة الذي يسببه فيروس الروتا.

قائمة التحقق قبل التطعيم

قبل تلقي اللقاح، أخبروا طبيبك أو ممرضتك إذا كان طفلكم:

- أكبر من الفئات العمرية الموصى بها لكل من الجرعتين
- مريضاً (درجة الحرارة أكثر من 38.5 درجة مئوية)
- لديه رد فعل خطير لأي لقاح
- لديه حساسية شديدة لأي شيء
- لديه انغماد معوي أو خلل خلقي قد يؤدي إلى الانغماد المعوي
- يأخذ أدوية الستيرويد
- تلقى نقل للدم أو منتجات الدم
- يعاني من إنخفاض المناعة بسبب نقص في الجهاز المناعي أو حالات الدم غير الطبيعية أو اضطرابات أو سرطان أو فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو بعض الأدوية
- إذا كان أحد أفراد أسرته يعاني من إنخفاض المناعة.

الآثار الجانبية للقاح فيروس الروتا

القاح ضد فيروس الروتا هو فعال وآمن على الرغم من أن جميع الأدوية يمكن أن يكون لها آثار جانبية غير مرغوب فيها.

قد تشمل الآثار الجانبية:

- براز بعض الأطفال يمكن أن يحتوي على فيروس الروتا بعد اللقاح - ينصح بغسل اليدين بعد تغيير الحفاضات دائماً والأشخاص الذين يعانون من انخفاض المناعة يجب أن يتجنبوا الحفاضات المتسخة خلال هذا الوقت.

الآثار الجانبية النادرة للتطعيم

هناك خطر صغير جداً لرد فعل خطير (الحساسية المفرطة) لأي لقاح. لهذا السبب يُنصح ببقاءكم في العيادة لمدة 15 دقيقة على الأقل بعد التطعيم في حالة الحاجة إلى مزيد من العلاج.

يمكن أن يحدث انغماد معوي (إنسداد يسببه إنزلاق جزء من الأمعاء إلى قطعة الأمعاء التالية مثل قطع التليسكوب) (في حالات نادرة) عند الرضع في الأسابيع الثلاثة بعد تلقي الجرعة الأولى أو الثانية من لقاح فيروس الروتا. قد تتضمن علامات إصابة الطفل بالإنغماد المعوي ما يلي:

- نوبات بكاء
 - مظهر شاحب
 - شدّ الساقين إلى الأعلى لتصل إلى المعدة.
- تشير الدراسات الحديثة في أستراليا وفي الخارج إلى أن هناك زيادة طفيفة في خطر الإنغماد المعوي بين الأطفال في الأسابيع الثلاثة الأولى بعد تلقي الجرعة الأولى والثانية من لقاح فيروس الروتا. الخطر هو ما يقرب من ست حالات إضافية من الإنغماد المعوي لكل 100000 رضيع تم تطعيمه أو 14 طفلاً إضافياً في السنة يصابون بالإنغماد المعوي في أستراليا.

أين تحصلون على المساعدة

- طبيبك
- خدمة التطعيم للحكومة المحلية
- موقع Better Health Channel <https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/rotavirus-immunisation>

للحصول على هذا المنشور في شكل يسهل الإطلاع عليه اتصلوا على الرقم 1300 882 008، وإذا لزم الأمر استخدموا خدمة المتتابع الوطنية (National Relay Service) 13 36 77، أو أرسلوا رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى immunisation@dhhs.vic.gov.au

معتمد ومنشور من قبل حكومة فيكتوريا، 1 Treasury Place, Melbourne.

© ولاية فيكتوريا، Department of Health and Human Services حزيران/يونيو 2017.