

Intervento in risposta a un'overdose di oppioidi

Segui questi passaggi per iniettare la fiala di naloxone

1

SICUREZZA


Controlla che la persona e l'area non pongano alcun pericolo.



2

OVERDOSE DA OPIOIDI? INDIVIDUA I SINTOMI

- La persona non risponde
- La persona ha le pupille a spillo
- Non respira normalmente: respirazione lenta e superficiale o russamento
- La persona ha la pelle pallida o fredda e le labbra e i polpastrelli blu o grigi



3

CHIAMA IL TRIPLO 0 (000)

Penso sia un'overdose



4


SDRAIA LA PERSONA SU UN FIANCO

Metti la persona nella posizione laterale di sicurezza.



5


ATTACCA L'AGO A UNA SIRINGA



6

AGITA LA FIALA


Picchietta o agita la fiala in modo che il liquido si trovi alla base.



7

REGGI LA FIALA

Tieni la base della fiala in una mano e afferra la parte superiore con l'altra.




continua alla pagina successiva

8

APRI LA FIALA


Apri la fiala spezzandone la parte superiore. Metti la parte spezzata in un fazzoletto o nel coperchio di una penna per ridurre il rischio di lesioni.



9

ASPIRA IL NALOXONE IN UNA SIRINGA


La fiala contiene una dose completa di naloxone.



10

POSIZIONA L'AGO


Inserisci l'ago nella parte esterna della coscia o nella parte superiore del braccio.



11

SOMMINISTRA UNA DOSE DI NALOXONE

Inietta la dose completa di naloxone. Se necessario, è possibile iniettarla attraverso gli indumenti.



12

LA PERSONA RESPIRA?


In caso contrario, utilizza la *respirazione artificiale*, se sai praticarla: metti la persona in posizione supina ed effettua due insufflazioni.



13

POSIZIONE DI SICUREZZA


Metti la persona nella posizione laterale di sicurezza. Resta con la persona fino all'arrivo dell'ambulanza.



14

RIPETI LA DOSE SE NECESSARIO

In caso di mancata risposta, inietta un'altra dose ogni 2 o 3 minuti fino a che la persona non si riprende o fino all'arrivo dell'ambulanza.



Utilizza il naloxone per invertire gli effetti di un'overdose da sostanze oppioidi (ad esempio eroina, morfina, metadone, ossicodone, oppiacei da prescrizione, fentanile). Ci vogliono tra i 2 e i 5 minuti prima che faccia effetto e questo durerà circa 30-90 minuti.

Per ricevere questo documento in un altro formato, invia un'e-mail all'indirizzo aod.enquiries@health.vic.gov.au

Autorizzato e pubblicato dal Governo del Victoria,
1 Treasury Place, Melbourne.

Disponibile all'indirizzo <https://www.health.vic.gov.au/aod-treatment-services/victorias-take-home-naloxone-program>