

ការឆ្លើយតបចំពោះការប្រើថ្នាំ អ៊ុប៊ីអយ (Opioid) ហួសកម្រិត

អនុវត្តតាមជំហានទាំងនេះសម្រាប់ការបាញ់ច្រមុះនូវថ្នាំ Nyxoid

1

សុវត្ថិភាព


ពិនិត្យមនុស្សនោះ និងផ្នែកជាក់លាក់សម្រាប់អ្វីដែលមិនមានសុវត្ថិភាព។



2

តើប្រើថ្នាំ OPIOID (អ៊ុប៊ីអយ) ហួសកម្រិតឬ? រកមើលសញ្ញានានា

- មិនមានការឆ្លើយតប
- ប្រស្រីភ្នែកជាប់គាំង
- មិនដកដង្ហើមធម្មតា - ដកដង្ហើមរាក់យឺតៗ ឬស្រមុក
- ស្បែកស្លេកស្លាំងឬត្រជាក់ បបូរមាត់និងចុងម្រាមដៃមានពណ៌ខៀវឬពណ៌ប្រផេះ



3

ហៅទូរសព្ទទៅលេខសូន្យបីដង (000)

ខ្ញុំគិតថាវាជាការប្រើប្រាស់ហួសកម្រិត



4

ឱ្យមនុស្សនោះដេកផ្ទាល់


ដាក់ឱ្យគាត់ដេកផ្ទាល់ ហើយពិនិត្យមើលថាច្រមុះស្រឡះ។



5

កាន់ថ្នាំ NYXOID ឱ្យយ៉ាងដូចនេះ


ត្រូវចាំថាថ្នាំ Nyxoid® មានតែ 1 ដូសប៉ុណ្ណោះ។



6

ដាក់ថ្នាំ NALOXONE ចូលទៅក្នុងច្រមុះ


សឹកក្បាលគម្របថ្នាំ Nyxoid® ទៅក្នុងរន្ធច្រមុះ។ ចុចសង្កត់រហូតទាល់តែវាឮឃ្លឹក ដើម្បីផ្តល់ដូសនោះ។



7

តើពួកគេដកដង្ហើមទេ?


បើមិនដូច្នោះទេ សូមប្រើការសង្គ្រោះឆ្លូវដង្ហើម ប្រសិនបើអ្នកដឹងពីរបៀបធ្វើផ្តល់ 2 ដង្ហើម។



8

ការរើបឡើងវិញ


ដាក់មនុស្សនៅក្នុង 'ទីតាំងមិនស្នះឆ្លូវដង្ហើម' ប្រសិនបើអ្នកដឹងពីរបៀបធ្វើដូចនោះ។ នៅជាមួយពួកគេរហូតដល់រថយន្តសង្គ្រោះមកដល់។



9

ផ្តល់ដូសម្តងទៀត ប្រសិនបើចាំបាច់

ប្រសិនបើគ្មានការឆ្លើយតបទេ សូមផ្តល់ដូសទី 2 នៃថ្នាំ Nyxoid® ទៅក្នុងរន្ធច្រមុះមួយទៀត។ បើមាន សូមផ្តល់ថ្នាំមួយដូសទៀតរៀងរាល់ 2 ទៅ 3 នាទីម្តង រហូតទាល់តែបុគ្គលនោះរើបឡើងវិញ ឬរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់មកដល់។



ប្រើថ្នាំ naloxone ដើម្បីបន្តការប្រើប្រាស់ថ្នាំ Opioid (អ្នកអាយ) ហ្សូសកម្រិត (ឧ. ថ្នាំហេរ៉ូអ៊ីន, មីរហ្វីន, មេតាដូន, អុកស៊ីកូដូន, ថ្នាំអ្នកអាយប្រើតាមវេជ្ជបញ្ជា, ហ្វេតាស៊ីល)។ វាត្រូវការពេល 2-5 នាទីមុននឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការ ហើយមានប្រសិទ្ធភាពប្រមាណជា 30-90 នាទី។