

Effetti collaterali dei vaccini

Dopo la vaccinazione, attendere almeno 15 minuti prima di andare via.
Consultare il retro della pagina per gli effetti collaterali comuni a tutti i vaccini.


Vaccini somministrati in data odierna ____ / ____ /20____. Orario di somministrazione dei vaccini _____.

Indicare i siti di iniezione barrando la casella appropriata: RA=braccio destro, LA=braccio sinistro, RL=gamba destra, LL=gamba sinistra.

Vaccino anti-rotavirus	Vaccino anti-difterite-tetano-pertosse-poliomielite-epatite B-Hib*	Vaccino anti-pneumococco	Vaccino anti-meningococco ACWY												
<p>Alcuni bambini eliminano il vaccino anti-rotavirus con le feci.</p> <p>Nella settimana successiva alla vaccinazione si raccomanda di lavarsi bene le mani dopo il cambio del pannolino.</p> <p>Via orale</p>	<p>* <i>Haemophilus influenzae</i> di tipo b</p>														
	<table border="1"> <tr><td>RA</td><td>LA</td></tr> <tr><td>RL</td><td>LL</td></tr> </table>	RA	LA	RL	LL	<table border="1"> <tr><td>RA</td><td>LA</td></tr> <tr><td>RL</td><td>LL</td></tr> </table>	RA	LA	RL	LL	<table border="1"> <tr><td>RA</td><td>LA</td></tr> <tr><td>RL</td><td>LL</td></tr> </table>	RA	LA	RL	LL
RA	LA														
RL	LL														
RA	LA														
RL	LL														
RA	LA														
RL	LL														
Vaccino anti- <i>Haemophilus influenzae</i> di tipo b (Hib)	Vaccino anti-difterite-tetano-pertosse	Vaccino anti-morbillo-parotite-rosolia-varicella	Vaccino anti-morbillo-parotite-rosolia												
	<p>Alcuni bambini di 18 mesi possono avere una forte reazione nel sito di iniezione, che si manifesta con arrossamento e gonfiore dalla spalla al gomito. I genitori dovrebbero informare il centro vaccinale o l'ente del Victoria per la sicurezza dei vaccini (si veda il retro della pagina).</p>	<p>Circa 7-10 giorni dopo la vaccinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> febbre (anche > 39 °C) leggera eruzione cutanea rossa (non infettiva) sintomi del raffreddore ingrossamento delle ghiandole salivari <p>Circa 5-26 giorni dopo la vaccinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> lieve eruzione cutanea simile alla varicella 	<p>Circa 7-10 giorni dopo la vaccinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> febbre (anche > 39 °C) leggera eruzione cutanea rossa (non infettiva) sintomi del raffreddore ingrossamento delle ghiandole salivari 												
<table border="1"> <tr><td>RA</td><td>LA</td></tr> <tr><td>RL</td><td>LL</td></tr> </table>	RA	LA	RL	LL	<table border="1"> <tr><td>RA</td><td>LA</td></tr> </table>	RA	LA	<table border="1"> <tr><td>RA</td><td>LA</td></tr> </table>	RA	LA	<table border="1"> <tr><td>RA</td><td>LA</td></tr> <tr><td>RL</td><td>LL</td></tr> </table>	RA	LA	RL	LL
RA	LA														
RL	LL														
RA	LA														
RA	LA														
RA	LA														
RL	LL														
Vaccino anti-difterite-tetano-pertosse-poliomielite	Vaccino contro il papillomavirus umano (HPV)	Vaccino anti-varicella	Vaccino anti-meningococco B												
<p>Alcuni bambini di 4 anni possono avere una forte reazione nel sito di iniezione, che si manifesta con arrossamento e gonfiore dalla spalla al gomito. I genitori dovrebbero informare il centro vaccinale o l'ente del Victoria per la sicurezza dei vaccini (si veda il retro della pagina).</p>	<ul style="list-style-type: none"> mal di testa leggero nausea lieve 	<p>Circa 7-10 giorni dopo la vaccinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> febbre (anche > 39 °C) <p>Circa 5-26 giorni dopo la vaccinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> febbre lieve eruzione cutanea simile alla varicella 	<ul style="list-style-type: none"> febbre (anche > 39 °C) Marchio Bexsero® per bambini di età inferiore ai 2 anni, somministrare paracetamolo nei 30 minuti precedenti la vaccinazione o il prima possibile dopo la vaccinazione. Dovrebbero seguire altre 2 dosi di paracetamolo somministrate a distanza di 6 ore 												
<table border="1"> <tr><td>RA</td><td>LA</td></tr> </table>	RA	LA	<table border="1"> <tr><td>RA</td><td>LA</td></tr> </table>	RA	LA	<table border="1"> <tr><td>RA</td><td>LA</td></tr> </table>	RA	LA	<table border="1"> <tr><td>RA</td><td>LA</td></tr> <tr><td>RL</td><td>LL</td></tr> </table>	RA	LA	RL	LL		
RA	LA														
RA	LA														
RA	LA														
RA	LA														
RL	LL														
Vaccino antinfluenzale	Vaccino anti-herpes zoster (fuoco di Sant'Antonio)	Vaccino anti-polio	Vaccino anti-epatite B												
<ul style="list-style-type: none"> dolori muscolari 	<ul style="list-style-type: none"> rossore, dolore, gonfiore e/o prurito nel sito di iniezione mal di stomaco dolori muscolari stanchezza, brividi, febbre si vedano le reazioni avverse rare sul retro 	<ul style="list-style-type: none"> dolori muscolari 													
<table border="1"> <tr><td>RA</td><td>LA</td></tr> <tr><td>RL</td><td>LL</td></tr> </table>	RA	LA	RL	LL	<table border="1"> <tr><td>RA</td><td>LA</td></tr> </table>	RA	LA	<table border="1"> <tr><td>RA</td><td>LA</td></tr> </table>	RA	LA	<table border="1"> <tr><td>RA</td><td>LA</td></tr> <tr><td>RL</td><td>LL</td></tr> </table>	RA	LA	RL	LL
RA	LA														
RL	LL														
RA	LA														
RA	LA														
RA	LA														
RL	LL														
Vaccino RSV	Altro														
<ul style="list-style-type: none"> affaticamento dolori muscolari 															
<table border="1"> <tr><td>RA</td><td>LA</td></tr> <tr><td>RL</td><td>LL</td></tr> </table>	RA	LA	RL	LL	<table border="1"> <tr><td>RA</td><td>LA</td></tr> <tr><td>RL</td><td>LL</td></tr> </table>	RA	LA	RL	LL						
RA	LA														
RL	LL														
RA	LA														
RL	LL														

Gli effetti collaterali comuni si verificano subito dopo la vaccinazione e durano 1-2 giorni

Le vaccinazioni possono causare le seguenti reazioni avverse:



Febbre lieve (< 38,5° C) di breve durata.



Irritabilità, irrequietezza, malessere o sonnolenza.




Dove è stato inserito l'ago: dolore, arrossamento, bruciore, prurito o gonfiore per 1-2 giorni e/o un piccolo nodulo duro per alcune settimane.


Cosa fare a casa:



Se il bambino ha la febbre, non coprirlo con troppi vestiti o coperte. Si può somministrare paracetamolo (seguire le indicazioni sulla confezione).



Allattare più frequentemente e/o dare più liquidi.



Mettere un panno bagnato freddo sul sito di iniezione.

Quando consultare il medico:



Se il dolore e la febbre non migliorano con il paracetamolo (ad es. Panadol').



Se le reazioni avverse non scompaiono o peggiorano, così come in caso di dubbi, consultare il medico o andare in ospedale.



Effetti collaterali molto rari dei vaccini che richiedono cure mediche immediate

- **Convulsioni febbrili:** causate da febbre alta, si verificano generalmente nei bambini di età inferiore ai 3 anni.
- Il bambino diventa improvvisamente pallido, debole e apatico da 1 a 48 ore dopo la vaccinazione. Il bambino si riprende completamente dopo poco tempo.
- **Blocco intestinale (intussuscezione):** si verifica quando una porzione dell'intestino scivola in quella successiva, come le parti di un telescopio. Può accadere ai bambini nei 7 giorni successivi alla prima e alla seconda dose di vaccino contro il rotavirus.
I segni di blocco intestinale includono:
 - attacchi di pianto,
 - letargia,
 - aspetto pallido,
 - vomito,
 - sollevamento delle gambe verso la pancia a causa del dolore addominale.
- **Infiammazione di un nervo del braccio (neurite brachiale):** provoca una sensazione di debolezza o intorpidimento del braccio.
- Una grave reazione allergica (anafilassi) che si verifica improvvisamente, di solito entro 15 minuti dalla somministrazione del vaccino, ma anche dopo alcune ore dalla somministrazione. I segni iniziali di anafilassi includono:
 - arrossamento e/o prurito della pelle,
 - problemi respiratori,
 - sensazione di disagio.
- **Sindrome di Guillain-Barré:** provoca paralisi ascendente e talvolta intorpidimento. In passato è stata in alcuni rari casi associata al vaccino antinfluenzale.
- Dopo aver ricevuto il vaccino contro l'herpes zoster (fuoco di Sant'Antonio), possono verificarsi le seguenti reazioni avverse:
 - eruzione cutanea simile alla varicella entro 2-4 settimane dalla somministrazione del vaccino,
 - malessere/febbre.

Se riscontri effetti collaterali importanti o imprevisti dopo la vaccinazione, contatta l'ente del Victoria per la sicurezza dei vaccini:

- chiama il 1300 882 924
- invia un'e-mail a enquiries@saefvic.org.au
- visita www.saefvic.org.au
- o scansiona il codice QR

Questo ente non fornisce una gestione immediata delle emergenze in caso di effetti collaterali.



NURSE-ON-CALL:

Chiama il 1300 606 024 da qualsiasi zona del Victoria per ricevere una consulenza sanitaria gratuita 24 ore su 24. In caso di emergenza, chiama sempre lo 000 o recati in ospedale.



Servizio di traduzione e interpretariato.
Chiama il 131 450

Per ulteriori informazioni: contatta il tuo medico, il servizio vaccinale del tuo comune o il tuo farmacista, oppure visita www.betterhealth.vic.gov.au/urgent-care-services

Per ricevere questa pubblicazione in un formato accessibile, invia un'e-mail a: immunisation@health.vic.gov.au

Materiale adattato dall'Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI). Australian Immunisation Handbook (Manuale australiano sulle vaccinazioni), Ministero della salute del Governo australiano, Canberra, 2025, immunisationhandbook.health.gov.au.

Autorizzato e pubblicato dal Governo del Victoria, 1 Treasury Place, Melbourne. © Stato del Victoria, febbraio 2025 (2310610)

Disponibile su: <https://www.health.vic.gov.au/publications/vaccine-side-effects>