

疫苗副作用

接种后请至少等候 15 分钟。

有关可能适用于所有疫苗的常见副作用，请参见下一页。

疫苗接种日期 ____ / ____ /20____。疫苗接种时间 _____。

通过勾选相应的方框来选择注射部位：RA=右臂，LA=左臂，RL=右腿，LL=左腿。

轮状病毒疫苗 (Rotavirus vaccine)	白喉-破伤风-百日咳-小儿麻痹症-乙肝-Hib*联合疫苗 (Diphtheria-tetanus-pertussis (whooping cough)-polio-hepatitis B-Hib* vaccine)	肺炎链球菌疫苗 (Pneumococcal vaccine)	脑膜炎球菌 ACWY 疫苗 (Meningococcal ACWY vaccine)
有些婴儿会将轮状病毒疫苗随粪便排出。 在接下来的一周内，请在更换或处理脏尿布后注意手部卫生。 ☐ 口服	*流感嗜血杆菌 (b 型) (<i>Haemophilus influenzae</i> type b) RA LA RL LL	RA LA RL LL	RA LA RL LL
流感嗜血杆菌 B 型 (Hib) 疫苗 (<i>Haemophilus influenzae</i> type b)	白喉-破伤风-百日咳疫苗 (Diphtheria-tetanus-pertussis (whooping cough) vaccine)	麻疹-腮腺炎-风疹-水痘疫苗 (Measles-mumps-rubella-varicella (chickenpox) vaccine)	麻疹-腮腺炎-风疹疫苗 (Measles-mumps-rubella vaccine)
RA LA RL LL	有些 18 个月大的婴儿会出现从肩膀到肘部的注射部位大面积红肿反应，父母应向接种机构或维多利亚州疫苗安全服务机构 (Victorian vaccine safety service) 报告 (联系方式见下一页)。 RA LA	接种疫苗后约 7 至 10 天： • 发烧 (可达 39°C 以上) • 淡红色皮疹 (不具传染性) • 普通感冒症状 • 唾液腺肿胀。 接种疫苗后约 5 至 26 天： • 轻微的水痘样皮疹。 RA LA	接种疫苗后约 7 至 10 天： • 发烧 (可达 39°C 以上) • 淡红色皮疹 (不具传染性) • 普通感冒症状 • 唾液腺肿胀。 RA LA RL LL
白喉-破伤风-百日咳-小儿麻痹症疫苗 (Diphtheria-tetanus-pertussis (whooping cough)-polio vaccine)	人类乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗 (Human papillomavirus (HPV) vaccine)	水痘疫苗 (Varicella (chickenpox) vaccine)	B 型脑膜炎球菌 (Meningococcal B)
有些 4 岁儿童会出现从肩膀到肘部的注射部位大面积红肿反应，父母应向接种机构或维多利亚州疫苗安全服务机构 (Victorian vaccine safety service) 报告 (联系方式见下一页)。 RA LA	• 轻微头痛 • 轻微恶心。 RA LA	接种疫苗后约 7 至 10 天： • 发烧 (可达 39°C 以上)。 接种疫苗后约 5 至 26 天： • 发烧 • 轻微的水痘样皮疹。 RA LA	• 发烧 (可达 39°C 以上) • 如为 2 岁以下儿童接种 Bexsero® 品牌的疫苗，请在接种前 30 分钟或尽快在接种疫苗后让其服用扑热息痛。随后应再服用 2 剂扑热息痛，间隔 6 小时。 RA LA RL LL
流感疫苗 (Influenza vaccine)	带状疱疹疫苗 (Zoster (shingles) vaccine)	小儿麻痹症疫苗 (Polio vaccine)	乙肝疫苗 (Hepatitis B vaccine)
• 肌肉疼痛。 RA LA RL LL	• 注射部位泛红、疼痛、肿胀和/或发痒 • 胃部不适 • 肌肉疼痛 • 疲倦、发冷、发烧 • 请参阅下一页了解罕见反应。 RA LA	• 肌肉疼痛。 RA LA	RA LA RL LL
呼吸道合胞病毒疫苗 (RSV vaccine)	其他		
• 疲劳 • 肌肉疼痛。 RA LA RL LL	RA LA RL LL		

常见的副作用会在接种疫苗后不久出现，并持续 1 至 2 天


接种疫苗可能引起以下反应：



发低烧（不超过 38.5°C），且持续时间不长。



哭闹、难以安抚、不开心或嗜睡。



注射部位：酸痛、泛红、灼热、瘙痒或肿胀持续 1-2 天和/或出现小硬块并持续数周。


在家里需要注意些什么：



如果孩子发烧，不要穿让他们太多衣服或盖太多毯子。可以让他们服用扑热息痛（查看标签以确保正确使用）。



需要更频繁地母乳喂养和/或补充额外的液体。



将一块用冷水打湿的布敷在注射部位。


何时应寻求医疗建议：



如果服用扑热息痛仍无法缓解疼痛和发烧（例如服用 Panadol[®]）。



如果反应没有自行消失或变得严重，或者您感到担心，请去看医生或去医院。



如出现非常罕见的疫苗副作用，请立即就医

- **热性惊厥：**由高烧引起，通常发生在 3 岁以下的儿童身上。
- 孩子接种疫苗后 1 至 48 小时内突然变得面色苍白、虚弱无力且反应迟钝。但不久之后，孩子就完全恢复了。
- **肠梗阻（肠套叠）：**当肠道的某一部分滑入另一部分时就会发生这种情况，就像望远镜的镜筒折叠起来一样。儿童在接种第一剂和第二剂轮状病毒疫苗后的 7 天内可能会出现这种情况。
肠梗阻的症状包括：
 - 一阵一阵的大哭
 - 昏睡
 - 面色苍白
 - 呕吐
 - 因腹痛将腿弯曲至腹部。
- **手臂神经炎（臂神经炎）：**导致手臂感到无力或麻木。
- 突然发生严重的过敏反应（过敏性休克），通常在接种疫苗后 15 分钟内发生，但也可在接种后数小时内发生。过敏性休克的早期症状包括：
 - 皮肤泛红或发痒
 - 呼吸问题
 - 看上去非常痛苦。
- **格林-巴利综合征（Guillain-Barre syndrome）：**导致上行性麻痹，有时还会导致麻木。过去几乎不与流感疫苗有关，即便有关联，这种情况也很少。
- 接种带状疱疹疫苗后，可能会出现以下反应：
 - 接种疫苗后 2 至 4 周内出现水痘样皮疹
 - 感觉不适或发烧。

如果接种后出现严重或不常见的副作用，请联系维多利亚州疫苗安全服务：

- 致电 1300 882 924
- 电子邮件 enquiries@saefvic.org.au
- 网站 www.saefvic.org.au
- 或扫描二维码。

该服务不提供针对副作用的即时紧急处理。



NURSE-ON-CALL（值班护士热线）：
无论在维多利亚州的哪个地区，您都可拨打 1300 606 024，24 小时全天候获得免费健康建议。如果您认为自己的情况紧急，应拨打 000 或去医院挂急诊。



口译服务。
请致电 131 450

如需更多信息：请联系您的医生、当地政府疫苗服务机构或社区药剂师，或访问 www.betterhealth.vic.gov.au/urgent-care-services

如需本出版物的无障碍版本，请发送电子邮件至：immunisation@health.vic.gov.au

材料改编自澳大利亚疫苗技术咨询小组（Australian Technical Advisory Group on Immunisation，简称 ATAGI）的信息。《澳大利亚疫苗手册》（Australian Immunisation Handbook），在 2025 年由位于堪培拉的澳大利亚政府卫生部出版，下载请访问 immunisationhandbook.health.gov.au。

经维多利亚州政府授权出版，地址：1 Treasury Place, Melbourne。© 维多利亚州，2025 年 2 月（2310610）

可通过以下网站查阅：<https://www.health.vic.gov.au/publications/vaccine-side-effects>